CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE GRÃOS DE CAFÉ ESPECIAIS E GOURMET DA REGIÃO DE TAQUARITINGA DO NORTE-PE

Wallysson Wagner Vilela Santos¹; Ana Letícia Toté de Medeiros²; Maria Vitória Lima Costa Donato³, Gustavo Henrique Daniel Santos Silva⁴ Suzana Pedroza da Silva⁵

RESUMO

A cafeicultura brasileira destaca-se mundialmente pelo grande potencial de produção. A produção em Taquaritinga do Norte – PE é de extrema importância para os pequenos e médios produtores, além de fortalecer a agricultura familiar e economia local. O presente trabalho teve como objetivo caracterizar físico-quimicamente bebidas extraídas com cafés especiais e *gourmet* da região de Taquaritinga do Norte. As amostras de café foram doadas pelos produtores da Associação dos Produtores Orgânicos de Taquaritinga (APROTAQ). Foram avaliadas 5 amostras de café (torra média, gênero *Coffea arabica*), de diferentes variedades, são elas: A (*Typica*, fermentado pelo método *Sprouting Process*); B e C (Catuaí Amarelo); D e E (*Typica*). Realizou-se a extração das bebidas utilizando as mesmas condições (8g de café para 100mL de água destilada a 92°C) em porta filtro Koar de cerâmica. Posteriormente, realizou-se as análises: Acidez Total (AT), pH, Condutividade Elétrica (CE), Extrato Aquoso (EA), Sólidos Solúveis Totais (SST) e Rendimento de Extração (RE). Os resultados foram submetidos a Análise de Variância (ANOVA) (Coeficiente de Variação, CV) e Teste *Tukey* nos softwares R (versão 4.1.1) e Rstudio (versão 1.4.1717). Com relação a AT (CV=15,15%), as amostras diferiram entre si, a amostra B apresentou o maior valor, $1,08 \pm 0,06$ mol/100mL, enquanto que a amostra C o menor valor, $0,39 \pm 0,10$ mol/100mL. Apesar de serem da mesma variedade, essa diferença pode ser explicada devido ao fato das amostras serem de diferentes produtores e que podem ter sido colhidos em diferentes estágios de maturação afetando a composição final das bebidas. Observou-se uma relação inversa com a AT e pH, maiores concentrações de AT resultaram em bebidas com baixo pH. A amostra C ($5,30 \pm 0,02$) apresentou maior pH (CV=0,64%), enquanto que a amostra B menor ($4,85 \pm 0,00$). As amostras A e B apresentaram os maiores valores (não diferiram estatisticamente) para a CE (CV=0,46%) ($3,23 \pm 0,12$ e $3,22 \pm 0,06 \mu\text{s} \cdot \text{cm}^{-1}$ respectivamente), o menor valor para CE foi $2,79 \pm 0,39 \mu\text{s} \cdot \text{cm}^{-1}$ (amostra D). Os valores encontrados para CE foram relativamente baixos, pois grãos de alta qualidade, tendem a apresentar menores valores para esta variável. As amostras apresentaram EA de até 18,82 (CV=1,07%), sendo a análise realizada com a bebida preparada e não com o pó, o que pode ter levado a um mais baixo teor. Responsáveis pelo atributo sensorial denominado corpo da bebida, os SST (CV=3,04%) das amostras D e E variaram de $2,0 \pm 0,00$ - $2,56 \pm 0,03$ % °Brix. Todas as amostras para RE (CV=3,13%) diferiram significativamente, variando de $18,14 \pm 0,74$ - $27,24 \pm 0,89$ %, duas amostras (C e E) apresentaram valores fora da faixa considerada ideal (18,0 – 22,0%), podendo indicar bebidas com características sensoriais indesejáveis. Nota-se que apesar de algumas amostras serem da mesma variedade (Catuaí amarelo ou *Typica*), beneficiamento, fermentação natural ou induzida, e torra (média), os parâmetros avaliados apresentaram diferenças estatísticas, o que indica que as técnicas agrícolas empregadas nos processos pré e pós colheita são capazes de alterar as características químicas e físico-químicas das bebidas.

Palavras-Chave: Caracterização físico-química, Café especial, café gourmet, Café orgânico.

¹ Engenharia de Alimentos, Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, wallysson70@gmail.com

² Engenharia de Alimentos, Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, analeticiatote@gmail.com

³ Engenharia de Alimentos, Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, vitoriadonato57@gmail.com

⁴ Engenharia de Alimentos, Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, gd30440@gmail.com

⁵ Dra em Engenharia Química, Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, suzana.pedroza@ufape.edu.br